




Uputstvo za primenu HIRAVET probiotika




Telad:

Probiotik pomešan sa zamenom za mleko ili posebno smlaćeno na ambijentalnu temperaturu

Indikacije:

- 2.-3. dana po rođenju, odmah posle kolostruma;
- u periodu zalučenja;
- pre, tokom ili nakon transporta životinje
- prilikom davanja antibiotika
- pred izlazak na pašu (proleće) ili po prekidanju ispaše (prelazak na stajski režim u zimskom periodu),
- kod pojave crevnih infekcija.

Doziranje: po 100 ml dnevno u trajanju od 5-10 dana, po potrebi i duže dok se tele ne stabilizuje



Krmače:

10 dana pre prašenja po 100 ml dnevno, u trajanju od 10 dana (u slučaju da se prašenje desi pre isteka 10 dana nastaviti sa davanjem i posle prašenja do isteka 10 dana).

Prasići:

na zalučenju po 20 ml dnevno po prasetu, u trajanju od 5-10 dana, kroz medikator ili sistem za vodu.



Koze:

- Pre jarenja
- pred izlazak na pašu (proleće) ili po prekidanju ispaše (prelazak na stajski režim u zimskom periodu),

Jarići:

- 2.-3. dana po rođenju, odmah posle kolostruma;
- u periodu prelaska na čvrstu hranu;
- pre, tokom ili nakon transporta životinje
- prilikom davanja antibiotika
- kod pojave crevnih infekcija.

Doziranje: po 50 ml dnevno u trajanju od 5-10 dana, po potrebi i duže dok se životinja ne stabilizuje

Ovce:


- Pre jagnjenja
- pred izlazak na pašu (proleće) ili po prekidanju ispaše (prelazak na stajski režim u zimskom periodu),



Jaganjci:

- 2.-3. dana po rođenju, odmah posle kolostruma;
- u periodu prelaska na čvrstu hranu;
- pre, tokom ili nakon transporta životinje
- prilikom davanja antibiotika
- kod pojave crevnih infekcija.

Doziranje: po 50 ml dnevno u trajanju od 5-10 dana, po potrebi i duže dok se životinja ne stabilizuje



Pilići (brojleri):

- jednodnevni pilići odmah po izleganju/dolasku na farmu
- odrasli pilići (30-35 dana) 5-10 dana pre kraja tova

Doziranje: 1 l probiotika na 1000 pilića dnevno u trajanju od 5-10 dana, kroz medikator ili sistem za vodu.

Koke nosilje:

- po izleganju
- pri zasnivanju novog jata
- ukoliko opadne produktivnost (nose manje jaja)
- kod pojave bolesti i/ili infekcija u jatu

Doziranje: 1 l probiotika na 1000 pilića dnevno u trajanju od 5-10 dana, kroz medikator ili sistem za vodu.